



ΑΡΑΨ ΕΚ ΜΕΚΚΑΣ



ΓΥΝΗ ΕΚ ΜΕΚΚΑΣ

ται πλησίον μικρῶν καὶ ἀσθενῶν. Ἄλλ' ὁ κανὼν εἶναι τὸ ὠφέλιμον καὶ οὐχὶ τὸ εὐχάριστον· ἄλλως τε δὲν βλέπτει καὶ πολὺ, διότι τὰ ἄνθη ἀφίνονται ν' ἀνοίξωσι μόνον ὀλίγον τι, ὅπως φανῇ τὸ χρώμα των καὶ ἀποδειχθῇ τὸ εἶδος των. Ἡ ἀποκοπὴ αὕτη τοῦ ἄνθους ἀφίνει τὰ φύλλα ν' ἀναπτυχθῶσι καθ' ὁλοκληρίαν καὶ βοηθεῖ τὴν αὐξησιν καὶ εὐεξίαν τῶν βολβῶν. Ἡ τελειώσις ἢ φυτεία περὶ τὰ τέλη τοῦ Ὀκτωβρίου, τὸ ἔδαφος καλύπτεται μὲ χόρτον καλάμου ἢ ἄχουσιν 4 δακτύλων, καὶ τοῦτο ὅπως προφυλαχθῇ ἀπὸ τοῦ παγετοῦ. Κατὰ τὴν ἀνοιξιν, ὅταν τὰ φυτὰ ἀρχίζουσι νὰ φαίνωνται, ἀποσύρεται τὸ κάλυμμα τοῦτο ὀλίγον κατ' ὀλίγον.

Ἡ ἐποχὴ τῆς ἀνθήσεως εἶναι περὶ τὰ τέλη τοῦ Ἀπριλίου, ἐνίοτε καὶ τὸν Μάιον. Ἡ ἀνθὸς ἐξακριβωθῇ, κόπτεται ἢ ἄκρα του καὶ τὸ φυτὸν ἀφίνεται νὰ ὠριμάσῃ. Περὶ τὰ τέλη τοῦ Ἰουνίου τὰ φύλλα μακρύνονται ἐντελῶς. Οἱ βολβοὶ τότε ἐκφυτεύονται, τὸ φύλλωμα κόπτεται ἐπιμελῶς, αἱ δὲ ρίζαι διευθετοῦνται καλῶς. Μεταφέρονται ἔπειτα εἰς καλύβας καὶ τίθενται ἐπὶ ξηρῶν σανίδων, ὅπου μένουσι 4—6 ἐβδομάδας. Μετὰ ταῦτα ἄρχεται ἡ τοποθέτησις καὶ ἡ ἐξαγωγή, αἵτινες ἀπασχολοῦντιν ἅπαν τὸ προσωπικὸν ἐκάστου κτήματος, μέχρις οὗ φθάσῃ πάλιν ὁ Σεπτέμβριος, ὁπότεν ἄρχεται πάλιν ἡ φυτεῖσις.

Διὰ τὴν ἐξαγωγήν ὁ ἄκινθος διαίρεται συνή-

θως εἰς 4 κατηγορίας ἢ ποιότητας. Πρῶτον οἱ μεγαλειότεροι, οἱ ὑγιέστεροι, οἱ ἔχοντες καλλίτερον σχῆμα βολβοί· δεύτερον οἱ ὀλίγον τι μικρότεροι· τρίτον βολβοὶ μόνον διὰ στρώματα, οἵτινες δὲν φέρουσι συνήθως ὄνομα· τέταρτον οἱ κακῶς ἐσχηματισμένοι βολβοί.

Διάφοροι εἶναι αἱ μέθοδοι, δι' ὧν πολλαπλασιάζεται ὁ ἀριθμὸς τῶν βολβῶν. Ἡ ἀρχαιοτέρα καὶ ἀπλουστερὰ μέθοδος εἶναι ἡ ἐξῆς. Ἀφίνεται τὸ φυτὸν εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἀφοῦ ἀποκτήσῃ τὴν τελείαν του ἀνάπτυξιν, τότε ἀριθμὸς βλαστῶν (παραφυάδων) φύεται περὶ τὸν κύριον βολβόν, ὅστις παρακαμάζει. Ἄλλη μέθοδος εἶναι νὰ κοιταίνωνται καλοὶ καὶ ὑγιεῖς βολβοὶ εἰς τρόπον ὥστε ν' ἀφαιρῇται μέρος ἐσωτερικὸν καὶ τὸ κάτω μέρος τοῦ βολβοῦ· ὅταν δὲ οὗτος φυτευθῇ, πολλοὶ μικροὶ βολβοὶ φύονται ἐντὸς τῆς κοιλότητος. Ἄλλη πάλιν μέθοδος πολλαπλασιασμοῦ εἶναι ἡ διὰ πολλῶν τομῶν εἰς τὴν βάσιν τοῦ βολβοῦ. Αἱ τομαὶ αὗται εἶναι βαθεῖαι καὶ διασταυροῦνται εἰς τὸ κέντρον. Μετὰ τὸ φύτευμα νέοι βολβοὶ φύονται εἰς τὰς τομάς. Ἡ δευτέρα καὶ ἡ τρίτη μέθοδος εἶναι αἱ μᾶλλον ἐν χρῇσει. Πολλὰ εἶδη φέρουσι καλλίτερα ἀποτελέσματα ὅταν κοιταίνωνται, ἄλλα δὲ ὅταν κόπτονται. Διὰ τοῦ τρόπου τῆς κοιλάσεως παρέρχονται 6 ἔτη πρὶν ὁ νέος βολβὸς ἀναπτυχθῇ ἐντελῶς, διὰ τῆς τομῆς συνήθως 4 μόνον· ἀλλὰ διὰ τοῦ πρώτου φύεται μεγαλύτερος ἀριθμὸς νέων βολβῶν,