

προκύψαν ἀναμφιβόλως ἐκ τῆς καλλιεργείας, τὰ ἐν τῷ καρπῷ σπέρματα ἔχονται καὶ δὲν ἀναπτύσσονται διόλου, ὅπερ τὴν καθιστᾶ πολυτελεστέραν.

Ἡ μόνη δὲ προετοιμασία τὴν ὁποίαν ἀπαιτεῖ πρὶν φαγωθῆ ὁ καρπὸς αὐτος, συγίσταται εἰς τὸ νὰ κοπῆ εἰς τεμάχια, καὶ νὰ ἐψηθῇ ἐπὶ τῶν ἀνθράκων, ἢ καὶ νὰ τεθῇ ἀκέραιος ἐντὸς κλιβάνου, μέγρις δτοῦ ἡ ἔξωτερική ἐπιφάνεια του μαυρίσῃ. Γότε δὲ, ἀφ' οὗ καθαρισθῇ ἀπὸ τὰ ἔξωτερικὰ περικαλύμματα του, τὸ ἐντὸς αὐτοῦ εἶναι λευκὸν, μαλακόν, ἐλαστικὸν, καὶ ἀνάλογον μὲ τὸ ἔσωτερικὸν μέρος του ἀρτου. Όμοιάζει δὲ πολὺ κατὰ τὴν γεῦσιν μὲ τὸ ἐκ σίτου ἀρτον, ἀλλ ἔχει τι ἀναμιμητικὸν τὴν κυνάρκην καὶ τὸ κολοκάσιον.

Οχτὼ μῆνας κατ' ἑτοῖς, ἀπὸ Ἰουανουαρίου μέχρι τέλους Αὐγούστου, αἱ Ἀρτοκαρπέαι φέρουσι διηγειῶς καρπούς, κατὰ δὲ τοὺς λοιποὺς τίσσαρας προετοιμάζουσι τὴν μέλλουσαν καρποφορίαν, διότι ἐντὸς αὐτῶν ἀναβλαστάνουσι καὶ ἀνθεῦσι. Πρὸς ἐφόδιον δὲ καὶ τῷ τεσσάρων τούτων μηνῶν, οἱ κάτοικοι προετοιμάζουσι διὰ τῶν καρπῶν εἶδός τι ζυμωθείση; μάζης τὴν ὁποίαν ἐψήνουσιν ἐντὸς τῶν κλιβάνων, διακόπτεις λάβωσιν ἀνάγκην τρύτης. Δύο δὲ Ἀρτοκαρπέαις ἀρκοῦσι κατὰ τὸ διάστημα ἐνὸς διακοπῆς ἑταῖρος νὰ θρέψωσιν ἔνα, μετρίως πολυσφάγον, ἄνθρωπον.

Εἰς πολλὰ δὲ μέρη τρώγουσι καὶ τὰ ἐντὸς τῶν καρπῶν σπέρματα, τὰ ὅπεικα ἐψήνουσιν ως παρ' ἡμῖν τὰ κάττανα. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον ἡ ἀπαραίτητος διὰ τὴν ζωὴν του ἀνθρώπου τροφὴ, ἥτις ἀποτελεῖ τὸ πολύτιμον του δένδρου τούτου. Διότι, διὰ μὲν τοῦ ἔσωτερικοῦ φλοιοῦ κατατκευάζουσι φορέματα, διὰ δὲ τῶν ξύλων του, τὰς οἰκίας καὶ τὰ πλοιάρια των, διὰ δὲ τῶν ἀπεξηραμένων ἀρρένων ἀνθῶν, ἐν εἶδος ἐγκύσματος (ūσκας) καὶ τέλος διὰ τοῦ γαλακτώδους ὅπου του εἴδων πρὸς ἄγραν τῶν πτηνῶν.

Τὰ κυριώτερα δὲ καὶ γνωστότερα εἴδη τῶν Ἀρτοκαρπῶν εἶναι τέλματα τὰ ἀκόλουθα.

1. Ἀρτοκαρπέα ἡ περίτητος (*Artocarpus incisa*). Αὕτη ἔχει εἰς τὰ ἄκρα τῶν φύλλων της βαθείας ἐντομάς φύεται δὲ εἰς τὴν μεσημβρινὴν Ἀσίαν, καὶ εἶναι ἡ κοινωτέρα καὶ καλητέρα τῶν ἀρτοκαρπεῶν.

2. Ἀρτοκαρπέα ἡ ἑτερόφυλλος (*Artocarpus heterophylla*). Αὕτη ἔχει τὰ φύλλα ὠσειδῆ, ἀνισα, λειότερα δὲ καὶ μικρότερα τῶν τῆς προλαβδώστης φύεται δὲ εἰς τὰς ἀνατολικὰς Ἰνδίας, τὰς Μελούχας, καὶ τὰς Φιλιππίνας νῆσους.

3. Ἀρτοκαρπέα ἡ ἀκεραιόφυλλος (*Artocarpus integrifolia*). Αὕτη γραπτηρίζεται ἀπὸ τὸ ἐντελῶς ἀκέραια ἄκρα τῶν φύλλων της καὶ τοὺς δρυθοὺς ιούλους τῶν ἀρρένων ἀνθῶν της. Φύεται δὲ εἰς τὰς ἀνατολικὰς Ἰνδίας, καὶ τὴν Κίναν, καὶ εἶναι περίτητος διὰ τὰ ἐντὸς τοῦ καρποῦ της σπέρματα. — Κλαδὸν τούτου τοῦ εἴδους περιστάνει καὶ ἡ παροῦσα εἰκόνων.

4. Ἀρτοκαρπέα ἡ Φιλιππίνειος (*artocarpus philippensis*) αὕτη φύεται ἀποκλειστικῶς εἰς τὰς Φιλιππίνας νῆσους.

5. Ἀρτοκαρπέα ἡ λάσιος (*Artocarpus hispida*) αὕτη φύεται εἰς τὸ Μαλαζάρ ἐπὶ τῆς πετρώδους καὶ ἀμμώδους παραλίας. "Οταν δὲ ἀπὸ τοῦ καρποῦ ταῦ



ΙΑΣΙΝΑ ΙΟΤΙΑ
Ἀρτοκαρπέα ἡ ἀκεραιόφυλλος.

τῆς φάγη τις πολὺ, παρενοχλεῖται ἀπὸ ἐνδος διστρέπτου εὔκοιλιότητος, τὴν ὁποίαν οἱ κάτοικοι εὔκολας καταπαύουσι πίνοντες ἀφέψημα τῶν φίλων ἢ τροφλοιοῦ του ίδιου δένδρου, τὰ ὅποια εἶναι στυπτικώτατα. Διὰ δὲ τῶν καλοσσαίων κορμῶν του δένδρου τούτου οἱ Ινδοὶ κατατκευάζουσι τὰ μονόξυλά των.

Αἱ ἀρτοκαρπέαι βιτανικῶς θεωρούμεναι εἶναι τύπος μιᾶς οἰκογενείας φυτῶν, ἥτις ἀπ' αὐτῶν καλεῖται οἰκογένεια τῶν «Ἀρτοκαρπεῶν». Ἡ δὲ οἰκογένεια αὐτῇ συγγενεύει μὲ τὴν τῶν Κυδῶν, τῶν Μωρεῶν καὶ τὴν τῶν Συκῶν.

Θ. Ο.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑ ΚΟΧΛΙΩΝ.

Πρίν περιγράψωμεν τὴν παραδίδον δοκιμὴν τοῦ διὰ κοχλιῶν τηλεγράφου, προλαμβάνουμεν νὰ διαδηλώσωμεν ὅτι δὲν ἀναδεγόμενα τὴν εὐθύνην τῷ διαδεσμού τειχείων τὰς ὁποίας διδύουσιν οἱ ἐφευρετεῖ αὐτοῦ διθέλει εύθωκιμήτετ. Ναι μὲν, πράγματα περιεργα ἐγένοντο ὑπὸ τοὺς ίδιους ήμῶν δρθαλμούς, διὰ μέσου παρατκευσίας τινός περιεχούστης κοχλίας πολλούς καὶ μεγάλους, ἀλλ' ἀποροῦμεν πῶς δι' αὐτῆς εἶναι δυνατόν νὰ αυτηθῇ ἀνταπόκρισις μεταξὺ τῶν δύο ήμισφαρίων, γινομένης γρήσεως μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς παγκοσμίου γήινοτης, μετὰ μεγίστης ταχύτητος καὶ ἀκεραιότητος, ὡς διατρυπίζονται οἱ ἐφευρετεῖ. Ἀλλ' ὅπως ποτ' ἀνῆ, καὶ ὅπως καὶ ἀγ. Ὀσιονο-