

δὲ βίος δὲν δύναται νὰ διαγεῖται αἰωνίως, ὡς δὲν δύναται νὰ καλύπτεται πάντοτε ὑπὸ τοῦ πέπλου τοῦ πένθους. Ἡ θλίψις καὶ ἡ χαρὰ εἰσὶν ἀναποσπαστῶς συνδεδεμέναι πρὸς ἀλλήλας. Ἀλλ' εἴτε ἡ θλίψις ἐμπνέει τὸν ποιητὴν εἴτε ἡ εὐθυμία, πάντοτε πρέπει νὰ ἐπικρατῇ ἐν αὐτῇ ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀλήθεια, διότι ἄλλως ἡ μὲν πρώτη καθίσταται ἀφόρητος, ἡ δὲ δευτέρα μεταβάλλεται εἰς εὐωχίαν μεθύσων. Ἡ ἐτέρα γνώμη παρὰ τοῦ αὐτοῦ ἐκφραθεῖσα, ὅτι μετριότης ἐν τῇ ποιήσει δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ, εἶναι ὀρθοτάτη καθ' ὅλην αὐτῆς τὴν ἑκταίν, διότι ἡ ποίησις δὲν εἶναι ὁ ἐπιούσιος ἄρτος τῆς φιλολογίας, ἀλλὰ ἡ πολυτέλεια αὐτῆς καὶ ἡ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἐν ὅλῃ αὐτῆς τῇ ἀκτινοβολῇ ἢ νὰ λείπῃ ἐντελῶς.

(Ἐπετι τὸ τέλος)

Θ. Βελλιανίτης

Η ΧΛΩΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ¹

ΣΥΝΘΕΤΑ COMPOSITÆ

1. ΚΟΡΥΜΒΟΦΟΡΑ CORYMBIFERÆ

- Στεροφόρον ἢ χρυσόβρασις, *Solidago Virga aurea* L. 2.
 Ἡρετέρων ὁ ἁλπειος ποικ. ὁ μείζων, *Erigeron alpinus* L. β. major Boiss. 3 (σπκν.) Π.
 Ἴνουλα ἢ βρεττανική, *Inula Britanica* L. 2.
 Ι. ἢ Παρνασσική, *I. Parnassica* Boiss. et Heldr. 1—2.
 Γναφάλιον τὸ δασικόν, ποικ. τὸ τῆς Σοφίας, *Gnaphalium silvaticum* L. (G. Sophiae Heldr.) 3 (σπάν.)
 Ἐβακία ἢ σμικροτάτη, *Evax perpusilla* Boiss. et Heldr. 2. (Ἀγ. Νικόλαος).
 Ἀχιλλεΐα ἢ χαιτήεσσα, *Achillea setacea* WK. 2.
 Α. ἢ μεγαλόφυλλος, *A. grandifolia* Friv. 2 (Γούρνα).
 Α. ἢ ὁλοσηρική, *A. holosericea* Sibth. 2—3 (συχν.)
 Α. τὸ Ἀσίζων, *A. Aizoon* Griseb. 3. (σπάν.)
 Α. ἢ σκιαδοφόρος, *A. umbellata* Sibth. 2—3 (συχν.)
 Α. ἢ τοῦ Φρασίον, *A. Fraasii* Sch. Bip. 3.

¹ Συνέχεια ἴδε προηγούμενον φυλλάδιον.

Ἀνθεμὶς ἡ βαφικὴ, ποικ. ἡ δισκοειδής, Anthemis tinctoria L. β. discoidea Fl. Gr. 1—2 (συχν.)

Α. ἡ Παρνασσική, A. Parnassica (Boiss. et Heldr. sub Cota) 2.

Α. ἡ ὄρεινή, ποικ. ἡ πολιὰ, A. montana L. β. incana Boiss. (A. Spruneri Boiss. et Heldr. ἄλλοτε) 2.

Χαμαιλέλη τὸ βήχιον, Fussilago farfara L. Κοινῶς χαμόλευκα (2.

Δωρορικὸν τὸ καρδιόφυλλον, Doronicum cordifolium Sternb. Ἀκόνιτον τοῦ Διοσκορίδου. Κοινῶς Σκορπίδι ἢ Σκορπιδόχορτο 2—3 (συχν.)

Σενέκιον τὸ νευρώδες, Senecio Nebrodensis L. 2—3 (συχν.)

Σ. τὸ τοῦ Χελδραϊχίου, S. Heldreichii Boiss. 3 (σπάν. Τρύπιος βράχος).

Σ. τὸ θαψοειδές, S. thapsoides DC. 2—3 (συχν.)

Σ. τὸ Μακεδονικόν, S. Macedonicus Griseb. 2 (Λιβάδι).

Σ. τὸ τοῦ Παρνασσῶ, S. Parnassi Boiss. et Heldr. 3 (σπάν.).

2. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΙΝΑΡΟΕΙΔΗ CINAREÆ

Ἐχίνωψ ὁ σφαιροκέφαλος, ποικ. ὁ Ταῦγέτιος, Echinops sphaerocephalus L. β. Taygeteus Boiss. et Heldr. 2.

Ε. ὁ Σαρτωριανός, E. Sartorianus Boiss. et Heldr. (E. Ritro L. γ. Sartorianus Boiss. Fl. or.) 2.

Ξηράνθεμον τὸ κλειστόν, Xeranthemum inapertum W. 1.

Ξ. τὸ κυλινδροειδές, X. cylindraceum Sibth. 1.

Καρλίνα ἡ κορυμβώδης, ποικ. ἡ τοῦ Ῥωθίου, Carlina corymbosa L. β. Rothii Heldr. et Sart. 1—2.

Κ. ἡ ψυχρόφιλος, C. frigida Boiss. et Heldr. 2—3.

Σταιχελινία ἡ μονάνθηλος, Stachelina uniflosculosa Sibth. 2—3.

Κάρδος ἡ κροτία, Carduus Gronius Boiss. et Heldr. 2—3 (συχν.).

Κ. ἡ νεύουσα, ποικ. ἡ Ταῦγέτιος, Carduus nutans L. β. Taygetea Boiss. et Heldr. 2—3.

Κίρσιον τὸ χιαστόν, Cirsium decussatum Janka. 2.

Κ. τὸ Ἰταλικόν, C. Italicum Savi 1.

Κ. τὸ Σικελικόν, ποικ. τὸ μακράκαρθον, C. Siculum Spreng. β. longispinum Boiss. 1. (θέσις Μπάνια).

Κ. τὸ ἀφρικανόν, C. Afrum Jacq. 2—3 (συχνὸν καὶ μετὰ τῆς Μορίνας λίαν χαρακτηριστικόν).

Ὀνόπορδον τὸ Παρνασσικόν, Onopordon Parnassicum Boiss. et Heldr. 2. Π.

Ο. τὸ μυριάκαρθον, O. myriacanthum Boiss. 2 (σπάν.).

Γουρινία ἡ γλυκάκαρθος Jurinea glycacantha Sibth. 2 (σπάν.)

Κενταύριον τὸ τῶν Μουσῶν, Centaurea Musarum Boiss. et Orph.

- Ἐν τῶν ὠραιοτέρων φυτῶν τοῦ Παρνασσοῦ, 3 (σπάν. Κλιστοζάστανο). Π.
Κ. ἡ Κύανος, *C. Cyanus* L. 1. (Ῥάχοβζ).
Κ. τὸ σχιστόφυλλον, *C. dissecta* Ten, 2 (συχν.) μετὰ ποικ. τῆς ἀλ-
 πείας (*C. alpina* Heldr.) 3. (κορυφαί).
Κ. τὸ Πηλιακόν, *C. Pelia* DC. 1—2.
Κ. τὸ Κεκκαρινιανόν, *C. Ceccariniana* Boiss. et Heldr. 2 (σπάν.
 ἄνωθεν τῶν Δελφῶν) Π.
Κ. τὸ ψιλάκανθον, *C. psilacantha* Boiss. et Heldr. 1—2. Π.
Κ. τὸ Σαλονιτιανόν, ποικ. τὸ μακράκανθον *C. Salonitana* Vis. β.
macracantha Boiss. 1 (Ῥάχοβα).

3. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΙΧΩΡΙΟΕΙΑΔΗ CICHORACEÆ

- Λεοντόδων ὁ δορυμόρφος*, *Leontodon hastilis* L. 3. (σπάν).
Λ. ὁ ἐλληνικός, ποικ. ὁ *Χελδραϊχίανος* L. *Graecus* Boiss. et Heldr.
 β. *Heldreichianus* Boiss. 3.
Τραγοπόγων ὁ τοῦ Σαμαριτανίου, *Tragopogon Samaritanii* Heldr.
 et Sart. 2. (σπάν.).
Θρίδαξ ἡ Ἑλληνική, *Lactuca Graeca* Boiss. 2. (Μαυρολιθάρι).
Θ. ἡ ἐπιτοίχιος, *L. muralis* L. 2.
Θ. ἡ λυγροειδής, *L. viminea* L. 2—3.
Κρηπίς ἡ πολιά, *Crepis incana* Fl. Gr. 3.
Ἱεράκιον τὸ μακράνθον, *Hieracium macranthum* Ten. 2—3.
Ἱ. τὸ ὑψιλόν, *H. præaltum* Vill. 2.
Ἱ. τὸ σαβίνον, *H. Sabinum* Seb. et Maur. 3.
Ἱ. τὸ ἐλληνικόν, *H. Græcum* Boiss. et Heldr. 3 (σπάν. Τρύπιος βράχος).
Ἱ. τὸ τοῦ Παρνασσοῦ, *H. Parnassi* Fries. 3. (κατὰ τὸν Spruner). Π.
Ἱ. τὸ πύκνोटριχον, *H. pannosum* Boiss. 3.
Ἱ. τὸ τοῦ Γωδρυίου, *H. Gaudryi* Boiss. 3. (σπάν.) Π.
Ἱ. τὸ σκηποφόρον, *H. scapigerum* Boiss, Orph. et Heldr. 3.
Ἱ. τὸ Σαρτωριανόν, *H. Sartorianum* Boiss. et Heldr. 3. (σπάν.).
Ἱ. τὸ ἐπιτοίχιον, *H. murorum* L. 2.
Ἱ. τὸ ἐλατόφυλλον, *H. abietinum* Reut. 2. (σπάν. Διπόταμος).
Ἱ. τὸ βρακτειοφόρον, *H. bracteolatum* Sm. 2.
Ἱ. τὸ πολέχομον, *H. crinitum* Sm. 2.

ΚΩΔΩΝΑΝΘΗ CAMPANULACEÆ

- Ἐδρανθός τὸ ἀγρωσιδόφυλλον*, *Edraianthus graminifolius* (L.)
 3 (σπάν. Τρύπιος βράχος).
Κωδωνίσκος ὁ πετρόφυλος, *Campanula rupicola* Boiss. et Sprun.
 Ἐν τῶν ὠραιοτέρων καὶ τῶν πλέον χαρακτηριστικῶν φυτῶν τοῦ Παρ-
 νασσοῦ, 2—3 (συχν.) Π.

Κ. ὁ ἀλλοιόχρους *C. versicolor* Sibth. 2. Κοινῶς Γλατόχορτον.

Κ. ὁ ριζώδης, *C. radicata* Bory et Chaub. 3.

Κ. ὁ Παρνασσικός, *C. Parnassica* Boiss. et Sprun. 3.

Κ. ὁ τραχηλιαῖος, ποικ. ὁ ἀνατολικὸς *C. Trachelium* L. β. Orientale Boiss. (*C. Athoa* Boiss. et Heldr.) 2.

Κ. ὁ σπαθιδόφυλλος, *C. spathulata* Sibth., Heldr. (*C. Spruneri* β. alpina Boiss.) 3.

Κ. τὸ Ἀεῖζωον, *C. Aizoon* Boiss. et Sprun. 3. II.

Ποδάνθηον τὸ λεμονιδόφυλλον, *Podanthum limonifolium* (Sibth. sub *Phyteumate*), Boiss. 2.

Π. τὸ τριχοκάλυκον, *P. trichocalycinum* (Ten. sub *Campanula*) Boiss. 2. (σπάνιον).

ΛΙΠΑΡΙΩΔΗ LENTIBULARIÆ

Λιπάριον τὸ δασυανθές, *Pinguicula hirtiflora* Ten. Τὸ μόνον ἐντομαφάγον φυτόν τῆς ἐλληνικῆς χλωρίδος¹. 2.

ΠΑΣΧΑΛΙΔΩΔΗ PRIMULACEÆ

Πασχαλὶς ἡ ἄκανθος, *Primula acaulis* Jacq. Κοινῶς Πασχαλοῦδες καὶ Δακρύκισα. 2.

Λυσιμαχία ἡ κελαιροπόρφυρος, *Lysimachia atropurpurea* L. 1. (Ράχρδα).

Λ. ἡ ἀναγαλλιδοειδής, *L. anagalloides* Sibth. 3.

ΑΠΟΚΥΝΩΔΗ APOCYNÆ

Βίγκα ἡ ποώδης, *Vinca herbacea* WK. 2.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΩΔΗ ASCLEPIADEÆ

Ἀρτιτοξικόν τὸ χιονόφυλλον, *Vincetoxicum nivale* Boiss. et Heldr. 3. (σπάν.).

Α. τὸ ὑπόφυλλον, *V. fuscum* Rehb. fil. 2. (Λειβάδι σπάν.).

ΓΕΝΤΙΑΝΩΔΗ GENTIANÆ

Ἐρυθραία τὸ Κενταύριον, *Erythraea Centaurium* Pers. Κοινῶς θερμόχορτον. 1—2.

ΠΕΡΙΑΛΛΟΚΑΥΛΑ CONVULVACEÆ

Περιαλλόκαυλον τὸ κοχλιοειδές, *Convolvulus cochlearis* Griseb. (*C. Parnassicus* Boiss. et Orph. ἄλλοτε) 2. (σπάν.).

Ἐπίθυμον τὸ μακράνθηρον, *Cuscuta macranthera* Heldr. et Sart. 3.

Ε. τὸ τῆς Καλλιόπης, *C. Calliopes* Heldr. et Sart. 3. (παράσιτον ἐπὶ τοῦ Δαφνωειδοῦς τοῦ ἐλαιοφύλλου). II.

Ἐ. ἡ λευκόσφαιρα, *C. leucosphæra* Boiss. et Heldr. 2.

¹ Id. Heldreich, eine insektenfressende Pflanze d. griech. Flora, in Oesterreichische botan. Zeitschrift, 1879, p. 294.

ΒΟΥΓΛΩΣΣΩΔΗ BORRAGINEÆ

Σύμφυτον τὸ βολβώδες, *Symphytum bulbosum* Schimp. Κοινῶς Στεκούλι. 2.

**Onosma* τὸ ἀστεροειδές, ποικ. τὸ ὠχρόν, *Onosma stellulatum* WK. β. *pallidum* Boiss. 2.

**Alkanna* ἡ ἐλληνική, ποικ. ἡ τραχύτριχος, *Alkanna Græca* Boiss. et Sprun. β. *hispidior* Boiss. (A. Bœotica A. DC.) 2.

Myosotis ἡ ὄψις, *Myosotis silvatica* Hoffm. 2.

**Omphalodes* τὸ τῆς *Λουκίλλας*, *Omphalodes Luciliæ* Boiss. Χαριέστατον φυτόν ἐν Ἑλλάδι μόνον ἐπὶ τῷ Παρνασσῷ φυόμενον, ἀφιερωθὲν ὑπὸ τοῦ Boissier εἰς τὴν σύζυγόν του. 2. (Γούρνα σπάν.) Π.

Mattia ἡ ἐλληνική, *Mattia Græca* Boiss. et Heldr. 2—3.

ΣΚΡΟΦΟΥΛΑΡΙΩΔΗ SCROFULARIACEÆ

Verbascum τὸ τοῦ *Γουικκιαρδίου*, *Verbascum Guicciardii* Boiss. et Heldr. 2 (Πάχουσα) Π.

B. τὸ ἐπιξανθόν, *V. epixanthinum* Boiss. et Heldr. 2—3.

B. τὸ δύσοσμον, *V. foetidum* Boiss. et Heldr. 2 (Διπόταμος).

B. τὸ ἐριοφόρον, *V. mallophorum* Boiss. et Heldr. 2—3.

B. τὸ εὐπρεπές, ποικ. ὁ μεγαλόφλομος *V. speciosum* Schrad. β. *megalophlomos* Boiss. et Heldr. Κοινῶς Φλόμος καὶ Ἀλεπουσιά. 2. Π.

Iinaria ἡ *Σιπθωρπιανή*, ποικ. ἡ *Παρνασσική*, *Iinaria Sibthorpiana* β. *Parnassica* Boiss. et Heldr. 2—3.

Scrofularia ἡ πτερυγωτή, *Scrofularia alata* Gilib. (S. Samari-tanii Boiss. et Heldr.) 2 (Γούρνα).

S. ἡ ἑτερόφυλλος, *S. heterophylla* W. 1—2.

Digitalis ἡ ὀργάνη, *Digitalis ferruginea* L. Κοινῶς Κορακόχορτον ἢ χελιδονόχορτον 2 (συχνότατη).

D. ἡ λεία, *D. laevigata* WK. 2 (συνή).

D. ἡ ἐριότριχος, *D. lanata* Ehrh. 3 (κατὰ τὸν Spruner).

Veronica ἡ θυμύφυλλος, *Veronica thymifolia* Sibth. 3.

V. ἡ *Χαμαεδρύς* ποικ. ἡ τριχωτή, *V. Chamaedrys* L. β. *pilosa* Boiss. 2.

V. ἡ τῶν *Τεύκρων*, *V. Teucrium* L. 2. (σπάν.).

V. ἡ ἀφυλλος, *V. aphylla* L. 3.

V. ἡ *Σαρτωριανή*, *V. Sartoriana* Boiss. et Heldr. 2 (σπάν.)

**Odontites* ἡ τοῦ *Λινκίου*, *Odontites Linkii* Heldr. et Sart. 2.

**Rhinanthus* τὸ μέγας, ποικ. τὸ *Παρνασσικόν*, *Rhinanthus major* Ehrh. β. *Parnassicus* Boiss. (*R. pubescens* Boiss. et Heldr.) 3 (σπάν.) Π.

Pedicularis τὸ ἐλληνικόν, *Pedicularis Græca* Bunge. 3 (σπάν.).

ΙΕΡΟΒΟΤΑΝΩΔΗ VERBENACEÆ

Ἱεροβούτανος τὸ ὑπτιον, Verbena supina L. 2 (Λιθόδοι).

ΧΕΙΛΑΝΘΗ LABIATÆ

Μένθα ἡ ἀγρία, Mentha silvestris L. Ἀγριοκνήσος 2.

Ὀρίγανος τὸ κοινόν, Origanum vulgare L. Κοινῶς Πίγκνη 2.

Ο. τὸ λασυότριχος, O. hirtum Vogel. 2. (συχν.)

Θύμος ὁ λευκιοειδής, Thymus leucoides Boiss. et Sprun. 3.

Θ. ὁ ἐρπυλλός, ποικ. ὁ τοῦ Σωβαρδίου, Th. Serpyllum L. β. Chauhaldi Boiss. et Heldr. 2 (συχν.).

Θ. ὁ δασύτριχος, Th. hirsutus MB. 2—3.

Θυμβρώδες τὸ Παργασσικόν, Satureia Parnassica Heldr. et Sart. 3.

Μικρομερές τὸ κρημνόφιλον, Micromeria cremnophila Boiss. et Heldr. 2 (Γούρνα σπάν.).

Καλαμίνθη ἡ ἁλπεία, Calamintha alpina (L.) 2—3.

Κ. ἡ εὐόσμος, C. suaveolens Sm. 2.

Κ. ἡ βαρύνοςμος, C. graveolens MB. 2.

Ἑλελίσφακος ὁ ῥυγχώτης, Salvia ringens Sibth. 2.

Ε. ὁ κοκκινίζων, S. Sclarea L. Κοινῶς Αἰζίνης ἢ Γοργοῖνης 1—6.

Ε. ὁ ἀργύρεος, ποικ. ὁ ἁλπειος, S. argentea L. β. alpina Heldr. 3.

Νεπέτα ἡ αἰλούριος, Nepeta cataria L. 1 (Δελφοί).

Ν. ἡ Παργασσική, N. Parnassica Heldr. et Sart. 2. Π.

Ν. ἡ γυμνή, N. nuda L. Κοινῶς Καλοῖνης 3. (συχν.).

Σκαρίδιον τὸ ἀρατολικόν, Scutellaria Orientalis L. 3 (σπάν.).

Σ. τὸ ξενικόν, S. peregrina L. (S. adenotricha Boiss. et Heldr.) μετὰ τῆς ποικ. τῆς Παργασσίας (β. Parnassia Heldr. et Sart.) 1—2.

Μαρούβιον τὸ ὀλοσθηκόν, Marrubium vultinum Sibth. Κοινῶς Βρωμόμουρος 2—3 (συχνότατον).

Σιδηρίτις ἡ τοῦ Ροεζέρου, Sideritis Roeseri Boiss. et Heldr. Κοινῶς Τσάκι ἐλληνικόν. 2—3.

Στάχυς ὁ Γερμανικός, ποικ. ὁ κρωβυλώδης, Stachys Germanica L. β. penicillata Heldr. et Sart. 3.

Σ. ὁ τοῦ Χελδρεϊχίου, St. Heldreichii Boiss. 2 (σπάν.).

Σ. ὁ τοῦ Σβαϊνσονίου, St. Swainsonii Benth. 1—2 (συχν.).

Σ. ὁ ἐπέτειος, St. annua L. 1. (Ῥέχοβα).

Βετονική ἡ τοῦ Ἰακουινίου, Betonica Jacquini Gren. et Godr. Κοινῶς Μπετόνικα. 2—3.

Λάμιον τὸ κατάγραφον ποικ. τὸ ἑλαττον, Lamium striatum Sibth. β. minus Boiss 2—3.

Λ. τὸ ποικίλον, L. pictum Boiss. et Heldr. 3.

Φλομὶς ἡ σαμία, Phlomis Samia L. 2.

Φ. ἡ κερτρώδης, *Ph. pungens* W. 1.

Τεύκριον τὸ διεστώς, *Teucrium divaricatum* Sieb. 2.

Τ. τὸ ὀρεινὸν ποικ. τὸ Παρνασσικόν, *T. montanum* L. β. *Parnassicum* Celak. 3. (σπάν.) Π.

ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΩΔΗ PLUMBAGINEÆ

Ἀκανθόλειμον ὁ Ἐχῖνος, *Acantholimon Echinus* (L. sub *Statice*) Boiss. 3.

Ἀρμερία ἡ μαγελλική, *Armeria Majellensis* Boiss. 3.

ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΩΔΗ PLANTAGINEÆ

Ἀρνόγλωσσον τὸ λογχοειδές, ποικ. τὸ κεφαλωτόν, *Plantago lanceolata* L. β. *capitata* Presl. 2—3.

ΧΗΝΟΠΟΔΙΩΔΗ CHENOPODIACÆ

Τευτλὴς ἡ νανοφυή, *Beta nana* Boiss. et Heldr. 3 (Στρούγγα Ὀσίου Λουκά).

Ἀγαθόφυτον τὸ ἀγριοσπανάκιον, *Agothophytum bonus Henricus* (L.) κοινῶς Ἀγριοσπανάκι 2—3.

ΠΟΛΥΓΟΝΩΔΗ POLYGONEÆ

Δάπαθον τὸ ὄξυρον, ποικ. τὸ ἄλπειον, *Rumex Acetosa* β. *alpinus* Boiss. 3.

ΘΥΜΕΛΑΙΩΔΗ THYMELEÆ

Δαφνοειδές τὸ ἐλαιόφυλλον, *Daphne oleoides* Schreb. 2—3 (συχνότε.).

Λυγία ἡ στρουθεία, *Lygia Passerina* (L.) 2.

ΣΑΝΤΑΛΩΓΗ SANTALACEÆ

Θήσειον τὸ τοῦ Παρνασσού, *Thesium Parnassi* A. DC. 2 (σπάν.).

Θ. τὸ τοῦ Μπεργέρου, *Th. Bergeri* Zuccar. 2 (σπάν.).

ΛΩΡΑΝΘΩΔΗ LORANTHACEÆ

Ἀρκευθόβιον τὸ τοῦ ὀξυκέδρου, *Arceuthobium Oxycedri* DC. Παράσιτον ἐπὶ τοῦ κορμοῦ τοῦ Ἀρκεύθου τοῦ Ὄξυκέδρου. 2. (Ἅγιος Νικόλαος).

ΕΥΦΟΡΒΙΩΔΗ EUPHORBIACEÆ

Εὐφώρβιον τὸ κατακλινές, *Euphorbia deflexa* Sibth. 2 (συχν.).

Ἐ. τὸ κηλοχορτιόφυλλον, *E. herniariaefolia* W. 2.

Ἐ. τὸ τοῦ Ὀρφανίδου, *E. Orphanidis* Boiss. 3 (σπάν.) Π.

Ἐ. τὸ τοῦ Χελδραϊχίου, ποικ. τὸ τοῦ Ροεζέρου, *E. Heldreichii* Orph. β. *Roeseri* Boiss. (*E. Roeseri* Orph. mss.) 2 (σπάν.) Π.

ΚΥΠΕΛΛΟΦΟΡΑ CUPULIFERÆ

Δρυς ἡ ἄπυος, *Quercus sessiliflora* Sm. Κοινῶς Δρὺ καὶ Δένδρον 2.

Δ. ἡ Πρῖνος ποικ. ἡ ψευδόπριμος, Q. coccifera L. β. pseudococcifera (Desf.) 1—2.

ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ ΜΟΝΟCΟΤΥΛΕΔΟΝΕΑΕ

ΑΡΩΔΗ ΑΡΟΙΔΕΑΕ

**Αρον τὸ στικτόν, Arum maculatum L. 2 (σπάν.).*

ΟΡΧΕΩΔΗ ΟΡΧΙΔΕΑΕ

**Ορχις ἡ στικτή, ποικ. ἡ μαρσιποφόρος, Orchis maculata L. β. sac-cigera (Brongn.) 2 (Διπόταμος).*

Γυμναδηρία ἡ κωροποσιδής, Gymnadenia conopsea (L.) 2. (σπάν.)

Κεφαλάρθησα ἡ ξιφόφυλλος, Cephalanthera ensifolia (Murr.) 2.

Κ. ἡ ὠχρά, C. pallens (W.) 2. (σπάν.).

**Επιπακτίς ἡ πλατύφυλλος, Epipactis latifolia All. 2 (σπάν.).*

**Ε. ἡ ἐρυθρομέλαινα, E. atrorubens Hoffm. 2 (σπάν.).*

ΙΡΙΔΩΔΗ ΙΡΙΔΕΑΕ

Κρόκος ὁ Βελούχιος, Crocus Veluchensis Herb. 2 (Λειβιάδι).

Κ. ὁ χρύσανθος, C. chrysanthus Herb. 2. (Λειβιάδι).

ΚΟΛΧΙΚΩΔΗ ΚΟΛΧΙΚΑΚΕΑΕ

Κολχικὸν τὸ παρνασσικόν, Colchicum Parnassicum Boiss. Orph. et Heldr. Κοινῶς Σπασόχορτον 2.

Κ. τὸ ὀρεινόν, C. montanum L. (C. Catacuzenium Heldr.) 2 (Λειβιάδι).

ΛΕΙΡΙΩΔΗ ΛΙΛΙΑΚΕΑΕ

Λείριον τὸ ἀρσιογενές, Lilium Martagon L. (L. Boissieri Orph. mss.) 2. (Διπόταμος, σπάν.).

Λ. τὸ τοῦ Χελδραχίου, L. Heldreichii Freyn. 1—2.

Κυβιστή ἡ τοῦ Γουικκιάρδιου, Fritillaria Guicciardii Heldr. et Sart. 2 (σπάν.).

Γαργία ἡ στεροπέταλος, Gagca stenopetala Fries. 2. (Λειβιάδι).

**Ορνιθόγαλον τὸ ὀρεινόν, Ornithogalum montanum Cyr. 2.*

Ο. τὸ λεπτόφυλλον, O. tenuifolium Guss. 2.

Σκόραδον τὸ τῶν ἀμπελώνων ποικ. τὸ ἐπύκλωρον, Allium vineale L. β. virens Boiss. (A. affine Boiss. et Heldr.) 3.

Σ. τὸ ἀρουραῖον, A. arvense Guss. 1.

Σ. τὸ καταφεγές, A. descendens L. 1.

Σ. τὸ τοῦ Γουικκιάρδιου, A. Guicciardii Heldr. et Sart. 3. (σπάν.) II.

Σ. τὸ ἀχαϊκόν ποικ. τὸ Παρνασσικόν A. Achaium Boiss. et Orph. β. Parnassicum Boiss. 3.

Σ. τὸ φοβήεν, ποικ. τὸ ὑπόχρον. *A. paniculatum* L. β. *pallens* Boiss 1—2.

Βοτρυανθὲς τὸ ἐπὶ χαρῖ, *Botryanthus pulchellus* Heldr. et Sart. (sub *Muscari*) 1.

Β. τὸ τοῦ Χελδοραΐχίου, Β. (*Muscari*) *Heldreichii* Boiss. 2.

Ἀσφοδιλιον τὸ ξανθόν, *Asphodeline lutea* (L.) 1—2.

ΑΣΠΑΡΑΓΩΔΗ ASPARAGINEÆ

Πολυγόνατον τὸ κοινόν. *Polygonatum vulgare* Desf. 2. (κατὰ τὸν Sibthorp.)

Π. τὸ πολυανθὲς, *P. multiflorum* (L. sub *Convallaria*). 2. (σπάν. Διπόταμος).

ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ GRAMINEÆ

Φλεῖον τὸ τοῦ Βοημερίου, *Phleum Boehmeri* Wib. 1.

Φ. τὸ λειμώριον, *Ph. pratense* L. 2—3.

Φ. τὸ ἄλπειον, ποικ. τὸ μετὰλλακτον, *Ph. alpinum* L. β. *commutatum* (Gaud.) 3.

Ἀλωπέκουρος ὁ τοῦ Γεραρδίου, *Alopecurus Gerardi* Vill. 3.

Λασιάγρωστις ἢ Καλαμάγρωστις, *Lasiagrostis Calamagrostis*, (L. sub *Agrostide*). 2 (Διπόταμος).

Ἀρρηνάθηρον τὸ ἐπηρμένον, ποικ. τὸ βολβώδες, *Arrhenatherum elatius* (L.) β. *bulbosum* (W.) 2.

Σεσλερία ἢ κνανίζουσα, *Sesleria caeruleans* Friv. 3.

Κοελερία ἢ λοφωτή, ποικ. ἢ μεγαλανθής, *Koeleria cristata* (L.) β. *grandiflora* (Bertol.) 2—3.

Μηλική ἢ βλεφαριδωτή, *Melica ciliata* L. 2.

Μ. ἢ Κρητική, *M. Cretica* Boiss. et Heldr. 3.

Βρίζα ἢ σταχυωτή, *Briza spicata* Sibth. 2.

Δακτυλὶς ἢ σφαιρωτή, *Dactylis glomerata* L. μετὰ τῆς ποικιλίας αὐτῆς τῆς ἰσπανικῆς (*D. glom.* β. *Hispanica* Roth.) 2—3.

Πόα ἢ τριχόφυλλος, *Poa trichophylla* Heldr. et Sart. 3 (συχν. εἰς τὰ ὄροπέδια μετὰ τῶν κορυφῶν). Π.

Π. ἢ Κενισία, *P. cenisia* All. (*P. oreophila* Boiss. et Heldr. mss.) 3 (Τρύπια σπηλαία).

Π. ἢ ἄλπεια, ποικ. ἢ Παρνασσική, *P. alpina* L. β. *Parnassica* Boiss. et Heldr. 3.

Π. ἢ ἄλσιχη, *P. nemoralis* L. 2.

Καρφοειδὲς τὸ μηλότροφον, *Festuca ovina* L. ἐν δύοσι ποικιλίαις τῇ γλαυκῇ (*Fest. glauca* Schrad.) καὶ τῇ βαλυσιακῇ (*Fest. Valesiaca* Schleich.) 2—3.

Κ. τὸ ποικίλον ποικ. τὸ *Κυλλήνιον*, *F. varia* Haenke β. *Cyllenica* Boiss. et Heldr. 2—3.

Κ. τὸ περίβλεπτον ποικ. τὸ *συνγερές*, *F. spectabilis* Jan. β. *affinis* (Boiss. et Heldr.) 2 (Ἀκρινόνερο).

Βραχυπόδιον τὸ δασικόν, *Brachypodium silvaticum* (Huds.) 2 (Διπόταμος).

Ἀγρόπυρος ὁ ἔρπων, *Agropyrum repens* (L. sub *Tritico*). Κοινῶς Ἀγριζάδα. 1—2.

Σήκαλις ἡ ὄρεινῃ, *Secale montanum* Guss. 2.

ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ GYMNOSPERMÆ

ΚΩΝΟΦΟΡΑ CONIFERÆ

Πεύκη ἡ Λαρικσειδής, *Pinus Laricio* Poir. Κοινῶς Μοτχοέλατο καὶ Ἀγριόπευκο, Πίτυς ἀγρία τοῦ Θεοφράστου 2.

Ἑλάτη ἡ τοῦ Ἀπόλλωνος, *Abies Apollinis* Link. Κοινῶς Ἑλατο (πληνθ. τὰ ἔλατα). Ἑλάτη ἡ ἄρην τοῦ Θεοφράστου, 2 (συχν., σχη-μκτίζει κυρίως τὰ δάση τῆς ἀνωτέρας ὑψώδους ζώνης).

Ἀρκευθός ἡ ὀξύκεδρος, *Juniperus Oxycedrus* L. Κοινῶς Κέδρος. Ὀξύκεδρος τῶν ἀρχαίων. 2.

Α. ἡ κοινὴ, *J. communis* L. 2. (σπάν.).

Α. ἡ ταπεινὴ, *J. depressa* Stev. (*J. hemisphaerica* Presl.) 3.

Α. ἡ δέσσομος *J. foetidissima* Willd., Boiss. (ἡ *Α. ἡ σαβινοειδής*, *J. sabinoïdes* Griseb.). Βράθυ τῶν ἀρχαίων. Κοινῶς Μαλόκεδρον. 2. Δενδρώδης καὶ συχνότατη ἀνήμετος ταῖς ἐλάταις.

Τάξος ὁ βαγοφόρος, *Taxus baccata* L., Σμίλαξ τῶν ἀρχαίων. Κοινῶς Ἰταμος. 2. (σπάν. Καρκάρια, συχνότερος ἐν τῇ Οἴτῃ¹).

ΚΡΥΠΤΟΓΑΜΑ ΑΓΓΕΙΟΦΟΡΑ CRYPTOGRAMÆ VASCULARES

ΠΤΕΡΙΔΩΔΗ FILICES

Πτέρις ἡ ἀετώδης, *Pteris aquilina* L. Κοινῶς Φτέρς. 1—3. (συχνό-τάτη πρὸ πάντων ἐν τῇ ζώνῃ τῆς Ἑλάτης).

Ἀδιαυτον τὸ καλλίτριχον, *Adiantum Capillus Veneris* L. Κοινῶς Πολυτρίχη. 1—2.

Ἀσπληνον τὸ Τριχομανές, *Asplenium Trichomanes* L. 2.

Α. ἡ Ῥυτὴ ἡ ἐπιτολχίος, *A. Ruta muraria* L. 2. (σπάν. Γούρνα).

¹ Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὄρεσι τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος δένδρων παράβ. Beldreich «Musini-tza» in «Delfner, Archiv für Mitt. u. neugr. Philologie», I. σελ. 89—103. 1880.

A. τὸ Ἀδαντον τὸ μέλαν, ποικ. τὸ τοῦ Οὐιργιλίου, *A.* *Adiantum nigrum* L. β. *Virgīlii* Bory. 2.

Ἀσπίδιον ἢ Λογχίτις, *Aspidium Lonchitis* (L. sub *Polypodio*) 2.

A. τὸ Ἀκανθωτόν, *A.* *aculeatum* (L. eup *Polypodio*) 2.

Νεφρόδιον Ἀσπιδόπτερις, *Nephrodium Filix mas* (L. sub *Polypodio*) 2.

N. τὸ ακλινόφυλλον, *N.* *rigidum* (Sw. sub *Aspidio*). 2.

Κυστόπτερις ἢ εὐθραυστος, ποικ. ἢ λεπτοσχιδής, *Cystopteris fragilis* (L.) β. *tenuisecta* Boiss. C. *Taygetensis* Heldr.) 2—3.

Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ Φανερόγαμα τε καὶ Κρυπτόγαμα Ἀγγειοφόρα φυτά, ὅσα μνημονεύονται ἢ παρατηρήθησαν μέχρι τοῦδε ὑπὸ τῶν βοτανικῶν ὡς αὐτοφυῆ ἐν ταῖς ὄρειναῖς ζώναις τοῦ Παρνασσοῦ. Ὑπολείπονται δ' ἐτι τὰ σχεδὸν ὅλως ἀγνώστα Κυτταρώδη Κρυπτόγαμα φυτά (ἴτοι τὰ Βρύα, αἱ Λειχήνες, τὰ Φύκη καὶ οἱ Μόκητες), ἐπέχοντα εὐρὺ θέμα παρατηρήσεων τοῖς φυτολόγοις τοῦ μέλλοντος.

Κατὰ Μάρτιον 1890.

Θ. Δὲ Χελδράχ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ἡ καλλιτεχνικὴ ἐκθεσις, ἣν τὸ τμήμα τῶν Καλῶν Τεχνῶν τοῦ ἡμετέρου Συλλόγου Παρνασσοῦ διοργάνωσεν, ἠνέωξε τὰς πύλας τῆς τὴν 8 Ἀπριλίου καὶ ἐκλείσεν αὐτὰς τὴν 4 Μαΐου. Πολλοὶ ἐπισκεφθῆσαν αὐτήν, ἐν οἷς ἡ Δ. Β. Υ. ὁ Διάδοχος μετὰ τῆς προκηπίσεως Σοφίας καὶ οἱ βασιλόπαιδες Γεώργιος καὶ Νικόλαος. Ἐδῶκε δὲ καλλιτεχνικὴν κίνησιν καὶ ζωὴν ἐπὶ τὸσάυτας ἡμέρας εἰς τὰς Ἀθήνας. Διὰ τοὺς μὴ ἐπισκεφθέντας αὐτήν γράφομεν ὀλίγας σημειώσεις.

Δὲ ἀρχίσωμεν ἀπὸ τῶ στεφθέντα μὲ χρυσοῦν μετάλλιον. Τὰ σκαριφήματα ἐν πρώτοις τοῦ κ. Γυζι. Ὁ κ. Ν. Γυζις εἶναι πασίγνωστος. Τὰ ἔργα, ἅτινα ἤδη ἐκθέται, εἶνε τὰ προσχεδιάσματα, αἱ πρῶται συλλήψεις τῶν πινάκων, οὓς βραδύτερον ἐξετέλεσε καὶ ἐπώλησε. Τὰ τοιαῦτα στιγμιαῖα, ἐν ᾧρα ἐνθουσιασμοῦ συλλαμβανόμενα καλλιτεχνήματα ὀνομάζονται παρὰ τοῖς Γάλλοις *esquisses*, παρὰ δὲ τοῖς Γερμανοῖς *skizzen*, ἡμεῖς δὲ ἀπεδώκαμεν τὴν λέξιν διὰ τῆς ἀντιστοίχου ἀρχαίας ἐλληνικῆς σκαριφήματα. Αἱ ἀπόκρεω μετὰξὺ αὐτῶν ἐξέχουσι διὰ τὸ θαυμάσιον τοῦ φωτισμοῦ καὶ τὴν ζωηρότητα τῆς παραστάσεως. Κάτωθεν ἀνήρτηται τὸ παρὰ τὴν ἐστίαν, ὅπερ ἐνθυμίζει τὰ μικρὰ τοῦ Ρέμβραντ ἐλαιογραφήματα. Ὁλητὴ τέχνη αὐτοῦ ἐγκείται ἐν τῇ φωτιστικῇ. Ἡ οἰκογένεια συνωθεῖται ὁλόκληρος